Campos de Cría y Evaluación
Presencia Comercial, Desarrollo y Testing

INNOVACION GENETICA ARGENTINA

Argenetics semillas

NUESTRA VISION SORGUIZACION

CONTACTOS COMERCIALES

Ing. Agr. R. Horacio Bienzobas
Gerente Marketing y Desarrollo
+54 9 2477 488873
hbienzobas@ciex-sa.com.ar

Lic. Economía Leonardo H. Drivet
Gerente Comercial
+54 9 2477 620016
ldrivet@ciex-sa.com.ar

Departamento Comercial:
Ruta Nac. 8 Km. 280,3
C.P. 2720, Colón Buenos Aires
info@argeneticssemillas.com.ar

1: Oeste de Buenos Aires y La Pampa	+54 9 2477 457152
2: Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe	+54 9 2477 332989
3: Entre Ríos y Sur de Corrientes	+54 9 3436 434904
4: Santa Fe (Centro y Norte)	+54 9 341 3425225
5: NEA (Chaco y Formosa)	+54 9 3644555066
6: Centro de Córdoba y NOA	+54 9 3543 629472
7: Sur de Córdoba y San Luis	+54 9 3585 599774
8: Sudeste de Buenos Aires y Cuenca del Salado	+54 9 2281 574228



MAIZ

GIRASOL

SORGO

www.argeneticssemillas.com.ar

MAIZ

	ARG 7712 BT RR2	ARG 7715 BTRRCL	ARG 7716 BTRR	ARG 7718	ARG 7742 FCL	ARG 8500 T	ARGENPOP 141	ARGENPOP 142
	Templado	Templado	Templado	Templado	Templado	Tropical	Pisingallo	Pisingallo
Tipo de híbrido	Simple	Simple	Simple modificado	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Altura de planta	195 cm	190 cm	200 cm	195 cm	210 cm	191 cm	200 cm	190 cm
Altura de inserción	95 cm	85 cm	90 cm	94 cm	80 cm	85 cm	90 cm	90 cm
Ciclo	124 mr	124 mr	123 mr	124 mr	125 mr	132 mr	-	-
Emergencia a floración	82 días	82 días	80 días	68 dias	70 días	53 días	65 días	68 días
Emergencia a madurez de cosecha	162 días	160 días	160 días	164 dias	166 días	171 días	152 días	155 días
Tipo de espiga	Cilindrica-cónica	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilindrica-cónica	Cilindrica	Cilindrica-cónica	Cilindrica	Cilindrica
Nº de hileras	18/20	18/20	18/20	18	18/20	18/20	14/16	14
Tipo y color de grano	Anaranjado	Amar./anar.	Amar./anar.	Amarillo/anaranjado	Duro/colorado	Duro/Colorado	Pisingallo	Pisingallo
Comportamiento a roya	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Comportamiento a helminthosporium	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Comportamiento a MDRC	Buena Tolerancia	Buena Tolerancia	Buena Tolerancia	Buena tolerancia	Buena tolerancia	Buena tolerancia	Tolerante	Tolerante
Fortaleza de tallo y raíz	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy buena	Muy buena
Potencial de rendimiento	Alto	Muy Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Estabilidad	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena
Región Recomendada	Centro N y O Bs As/ Córdoba/Sta Fe/ E.R, N de La Pampa. Uruguay.	Centro Norte y Oeste Bs As /Córdoba/Sta Fe/ NEA E.R, N de La Pampa. Uruguay.	Centro Norte y Oeste Bs As /Córdoba/Sta Fe/ NEA E.R, N de La Pampa.	Centro Norte y Oeste Bs As /Córdoba/Sta Fe/ NEA E.R, N de La Pampa.	N y O Bs As/ Córdoba/Sta Fe/E.R N de La Pampa.. Uruguay.	NOA y NEA Argentina Bolivia - Paraguay. Sur de Brasil.	NOA y NEA Argentina.	NOA y NEA Argentina.
Características para Silaje	Muy Bueno	Muy Bueno	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Muy Bueno		

Los valores informados corresponden a datos promedios de ensayos realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima, fecha de siembra, manejo, presión de enfermedades y otros. Consulte a nuestros RTV por recomendaciones.

SORGO

NUESTRA VISION SORGUIZACION

	MALON	ARGENSOR 110 T	ARGENSOR 121	ARGENSOR 130 T	ARGENSOR 125 B	ARGENSOR 151 DP	ARGENSOR 155 DP
	Híbrido de Sorgo Granífero.	Híbrido de Sorgo Granífero.	Híbrido de Sorgo Granífero.	Híbrido de Sorgo Granífero.	Híbrido de Sorgo Granífero Blanco	Doble Propósito Azucarado.	Doble Propósito.
Morfológicas-fenológicas							
Altura de planta	140 – 150 cm	130-140 cm	150 – 160 cm	150 – 160 cm	140 – 160 cm	180-200 cm	180-200 cm
Foliosidad	Abundante	Buena	Abundante	Muy folioso	Abundante	Muy folioso	Muy folioso
Ciclo emergencia-floración	68-72 días	65-68 días	72 - 76 días (*)	70-74 días	70-74 días	70-75 días	80-85 días
Ciclo emerg.-madurez fisiológica	115-120 días	110-115 días	120-125 días (*)	118-122 días	115-120 días	110-115 días (grano pastoso)	120-125 días (grano pastoso)
Crecimiento inicial	Vigoroso	Vigoroso	Vigoroso	Vigoroso	Vigoroso	-	-
Excersion	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena
Forma de panoja	Semi-abierta	Semi-compacta	Semi-abierta	Semi-compacta	Semi-abierta	Compacta	Semi Compacta
Color de grano	Marrón	Marrón	Rojo Brillante	Marrón	Blanco	Marrón	Marrón
Tamaño de grano	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande
Taninos condensados en grano	Si	Si	No	Si	No	Si (antipájaro) Tipo de tallo: Jugoso y dulce	Si (antipájaro)
Características sanitarias							
Sanidad foliar	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sanidad radicular	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy Buena	Muy buena	Muy Buena	Muy Buena
Comport. A downy mildew	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Comportamiento a pulgón	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E	Resistente a biotipo E
Comport. A hongos de panoja	Excelente	Excelente	Muy bueno	Excelente	Susceptible	Excelente	Excelente
Características agronómicas							
Tipo de cultivo	Producción de grano y forraje	Producción de grano	Producción de grano	Producción de grano y forraje	Producción de grano y forraje	Doble propósito Grano y silo de planta entera.	Doble propósito Grano y silo de planta entera
Ciclo de cultivo	Intermedio-corto	Ciclo Corto	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Completo
Producción de rastrojo	Abundante	Buena	Abundante	Abundante	Abundante	Abundante	Abundante
Calidad de rastrojo	Excelente “stay-green”	Muy Buena	Excelente	Excelente palatabilidad	Excelente “stay-green”	Excelente “Stay-green”	Excelente “Stay-green”
Producción de grano	Alto potencial	Muy Buena	Alto potencial	Alto potencial	Alto potencial	Alto potencial	Alto potencial
Comportamiento a pájaros	Resistente	Resistente	Susceptible (no es antipájaro)	Resistente	Susceptible	Resistente	Resistente
Comportamiento a vuelco	Muy bueno	Muy bueno	Muy Bueno	Muy bueno	Excelente	Bueno	Muy Bueno
Aptitud de cosecha en función de excersión de la panoja	Excelente	Muy bueno	Muy Buena	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Recomendaciones de uso	Uso agrícola: cosecha de grano seco. Uso forrajero: pastoreo del rastrojo. Reserva de forraje: -Silo de grano húmedo. -Silo de planta entera. Suplementación de vacunos: suministrar grano partido. Aves y cerdos: no recomendado.	Uso agrícola: Ideal para planteos de rotaciones que requieran precocidad sin resignar rendimiento. Suplementación de vacunos: suministrar grano partido. Aves y cerdos: no recomendado.	Uso agrícola: cosecha de grano seco / húmedo. Uso forrajero: Pastoreo del rastrojo. Reserva de forraje: - Silo de grano húmedo - Silo de planta entera Suplementación de vacunos: Excelente Aves y cerdos: Excelente	Uso agrícola: cosecha de grano seco y húmedo Uso forrajero: pastoreo del rastrojo. Reserva de forraje: – Silo de grano húmedo – Silo de planta entera Suplementación de vacunos: suministrar grano partido. -	Uso agrícola: cosecha de grano seco excelente como suplemento de alimento para monogastricos (aves y cerdos) pastoreo del rastrojo.	Uso agrícola: producción de grano y abundante rastrojo remanente. Ideal p/suelos de desmonte. Reserva de forraje: - Silo de planta entera: gran volumen de forraje de excelente calidad (Tallo dulce y alta producción de grano). 18-20 tn de materia seca /ha (*) Densidades sugeridas: 130000-150000 pl/ha Suplementación de vacunos: suministrar grano partido.	Uso agrícola: producción de grano y abundante rastrojo (silo, pastoreo diferido) Ideal para suelos de desmonte. Silo de planta entera (gran volumen de forraje de excelente calidad) Densidades sugeridas: 130000-150000 pl/ha suministrar grano partido.
Regiones recomendadas para su cultivo:	• Región central. (Norte de Bs.As., Centro y Norte de Cba., Centro de Sta.Fe) • Mesopotamia. (Entre Ríos y Corrientes) • Norte (Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa). • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.	• Regiones Central y Sur. • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.	• Región central: Norte de BsAs, centro y norte de Cba., centro de Sta.Fe • Mesopotamia: Entre Rios. • Norte.	Regiones recomendadas para su cultivo: Region central y norte de Argentina. • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.	• Región central. • Mesopotamia. • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.	• Región Central: Norte de Bs.As., Centro y Norte de Cba., Centro de S. Fe. • Mesopotamia: Entre Ríos y Corrientes • Norte: Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa. • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.	• Región Central • Mesopotamia: Entre Ríos y Corrientes • Norte: NOA Y NEA • Uruguay. • Paraguay. • Bolivia.

Los valores informados corresponden a datos promedios de ensayos realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima, fecha de siembra, manejo, presión de enfermedades y otros. Consulte a nuestros RTV por recomendaciones.

SORGO DE USO GANADERO

	Sorgo Silero	Sorgo Forrajero	Sorgo Forrajero Fotosensitivo
	ARGENSIL 163 D	**FORTIN COLON**	**ARGENFOR 180FS**
Tipo	Silero	Sudan	Sudan
Usos	Silo de planta entera Diferido	Pastoreo directo, Henificación, Cobertura, Diferido	Pastoreo directo Henificación, Diferido
Ciclo a floración	78-80 días	70-75 días	Acortamiento de Fotoperíodo
Altura planta	250 - 300 cm	250 - 300 cm	300 - 400 cm
Tallo	Grueso y jugoso, Muy Dulce	Fino	Fino
Foliosidad	Abundante	Exuberante	Exuberante
Rebrote	NO	Vigoroso	Vigoroso
Producción de forraje	20-25 Tn M.S./Ha (*)	80-100 Tn M.V./Ha (3 cortes, zona central)	100-120 Tn M.V./Ha (3 cortes, zona central)
Palatabilidad	Excelente (Muy Dulce)	Excelente	Excelente
Resistencia al pastoreo	NO	Resistente	Resistente
Comportamiento Sanitario			
Sanidad Foliar	Excelente	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Resistente	Resistente	Resistente
Recomendaciones de Uso			
Densidad de siembra	120000 pl/Ha	15-20 Kg de semilla /Ha	15-20 Kg de semilla /Ha
Cosecha	Ensilar al estado de grano pastoso.	Pastoreo intensivo antes de que la planta adquiera un metro de altura. Henificar antes de floración.	Pastoreo intensivo antes de que la planta adquiera un metro de altura. Henificar antes de floración
Región Recomendada	Toda la región agrícola ganadera de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.	Toda la región agrícola ganadera de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.	Región agrícola-ganadera NEA, NOA, Centro y Sur de Argentina y Uruguay.

Los valores informados corresponden a datos promedios de ensayos realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima, fecha de siembra, manejo, presión de enfermedades y otros. Consulte a nuestros RTV por recomendaciones.

GIRASOL

Argenetics semillas

	Excelente potencial de rendimiento. Ciclo completo.	Muy buen potencial de rendimiento. Alto % de aceite. Aceite de calidad alto oleico.	Muy buen potencial de rendimiento. Girasol Clearfield. (resistente a imidazolinonas)	Alto potencial de rendimiento
	ARGENSOL 20 MAX	**ARGENSOL 54 AO**	**ARGENSOL 72 CL**	**ARGENSOL 74 CL**
Tipo	Regular	Alto Oleico	Regular CL	Regular
Cruzamiento	Simple	Simple	Simple	Simple
Color de aquenio	Negro	Negro	Negro	Negro
Ciclo	Intermedio	Intermedio-corto	Intermedio	Intermedio-corto
Días a flor	75-77	74-75	77-78	75-77
Días a cosecha	115-120	110-115	115 - 120	110 - 115
Altura a cosecha	1.15 m	1.15 m	1.20 m	1.20 m
Inclinación del capítulo	Muy inclinado	Inclinado	Muy inclinado	Muy inclinado
Aceite %	48-50	52-54	48-50	48-50
Autocompatibilidad	Excelente	Muy bueno	Excelente	Excelente
Tolerancia Vuelco/quebr.	Muy bueno	Muy bueno	Muy bueno	Excelente
Sensib. al fotoperíodo	Insensible	Insensible	Insensible	Algo Insensible
Densidad a cosecha (pl.)	40000-45000	40000-45000	40000-45000	40000-45000
Comportamiento Sanitario				
Verticillium	Mod. Resistente	Mod. Resistente	Mod. Resistente	Mod. Resistente
Sclerotinia	Mod. Tolerante	Mod. Tolerante	Mod. Resistente	Tolerante
Roya Negra	Mod. Resistente	Mod. Resistente	Tolerante	Tolerante
Roya Blanca	Mod. Resistente	Mod. Resistente	Tolerante	Tolerante
Región Recomendada	Norte, Centro, y Oeste Argentino. Bolivia.	Norte, Centro Sudeste y Oeste Argentino.	Norte, Centro, Oeste, Sud Este y Sud Oeste Argentino.	Centro, Sur y Norte Argentino.
	Presentación Bolsa x 150.000 semillas	**Presentación** Bolsa x 150.000 semillas	**Presentación** Bolsa x 150.000 semillas	

Los valores informados corresponden a datos promedios de ensayos realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima, fecha de siembra, manejo, presión de enfermedades y otros. Consulte a nuestros RTV por recomendaciones.